

CALENDARIO VACUNACIÓN INFANTIL 2017

DL.V-3076-2016

2 MESES

Hepatitis B¹ • Difteria • Tétanos
Tos Ferina • Poliomielitis
Haemophilus influenzae Tipo B
Neumococo²

4 MESES

Hepatitis B • Difteria • Tétanos
Tos Ferina^{3,4} • Poliomielitis
Haemophilus influenzae Tipo B
Neumococo • Meningococo C

11 MESES

Hepatitis B • Difteria • Tétanos
Tos Ferina • Poliomielitis
Haemophilus influenzae Tipo B
Neumococo

12 MESES

Sarampión • Rubeola
Parotiditis • Meningococo C

15 MESES

Varicela

3-4 AÑOS

Sarampión • Rubeola
Parotiditis • Varicela

6 AÑOS

Difteria • Tétanos
Tos Ferina • Poliomielitis

12 AÑOS

Varicela⁵ • Meningococo C
Virus del Papiloma Humano⁶

14 AÑOS

Difteria • Tétanos⁷

1) Los hijos e hijas de madres portadoras del HBsAg recibirán la 1^a dosis en las primeras 12 horas después de nacer junto con la inmunoglobulina HB y la 2^a dosis de vacuna frente a la Hepatitis B al mes.
2) Los lactantes de alto riesgo recibirán una pauta de 4 dosis (2,4,6 y 15 meses).
3) Los niños y niñas nacidos antes de 2017 seguirán con una pauta de 3+1 con la 4^a dosis a los 18 meses y una 5^a dosis a los 6 años con vacuna dTpa.
4) Los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2017 recibirán la 4^a dosis como vacuna DTPa de alta carga.

5) Se completará la vacunación hasta dos dosis en niños/as sin antecedentes previos de enfermedad o vacunación.
6) Solo chicas con pauta de dos dosis. Recaptación de las jóvenes de hasta 18 años con esquema de 0,1-2 meses y 6 meses para las de 15 o más años.
7) A los 14 años se administrará la vacuna Td (tétanos difteria) para adultos. A partir de los 14 años, si ha recibido 5 o más dosis de tétanos revacunar a los 65 años.

CALENDARI VACUNACIÓ INFANTIL 2017

DLV3076-2016

2 MESOS

Hepatitis B¹ • Diftèria • Tètan
Tos Ferina • Poliomielitis
Haemophilus influenzae Tipus b
Pneumococ²

4 MESOS

Hepatitis B • Diftèria • Tètan
Tos Ferina^{3,4} • Poliomielitis
Haemophilus influenzae Tipus B
Pneumococ • Meningococ C

11 MESOS

Hepatitis B • Diftèria • Tètan
Tos Ferina • Poliomielitis
Haemophilus influenzae Tipus B
Pneumococ

12 MESOS

Xarampió • Rubèola
Parotiditis • Meningococ C

15 MESOS

Varicel·la

3-4 ANYS

Xarampió • Rubèola
Parotiditis • Varicel·la

6 ANYS

Diftèria • Tètan
Tos Ferina • Poliomielitis

12 ANYS

Varicel·la⁵ • Meningococ C
Virus del Papil·loma Humà⁶

14 ANYS

Diftèria • Tètan⁷

1) Els fills i les filles de mares portadores de l'HBsAg rebran una dosi de vacuna d'HB en les primeres 12 hores després de nàixer juntament amb la immunoglobulina HB.
2) Els lactants d'alt risc rebran una pauta de 4 dosis (2, 4, 6 i 15 mesos).
3) Els xiquets i les xiquetes nascuts abans de 2017 seguiran una pauta de 4 dosis amb la 4a dosi als 18 mesos i una 5a dosi als 6 anys amb la vacuna DTPa.
4) Els xiquets i les xiquetes nascuts a partir del 1^{er} de gener de 2017 rebran la 4a dosi com a vacuna DTPa d'alta càrrega.

5) S'ha de completar la vacunació fins a dos dosis en xiquets i xiquetes sense antecedents previs de malaltia o vacunació.
6) Només xiques, amb pauta de dos dosis. Recaptació de les joves de fins a 18 anys amb esquema de 0,1-2 mesos i 6 mesos per a les de 15 anys o més.
7) Als 14 anys s'administrarà la vacuna Td per a adults. A partir dels 14 anys, si ha rebut 5 dosis o més de tètan, cal revacunar als 65 anys.